

**GAMBARAN KEJADIAN PLASENTA PREVIA BERDASARKAN UMUR,
PARITAS DAN RIWAYAT SEKSIO CESAREA DI RSUD DR H CHASAN
BOESIRIE TERNATE TAHUN 2018 – 2019**

Sadaruddin Arief
Syamsul Bahri MS Hi Idris, Nurul Hikmah Petrana
Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran Universitas Khairun 2020

E - mail:sadaruddinariof@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim demikian rupa sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum. Plasenta previa adalah komplikasi yang serius pada kehamilan, yang merupakan penyebab utama perdarahan vagina setelah 20 minggu. Penyebab pasti plasenta previa belum diketahui, tetapi ada beberapa faktor yang dapat beresiko terjadinya plasenta previa seperti usia ibu saat hamil, paritas, merokok, riwayat seksio sesarea, cacat rahim dan kehamilan ganda. Angka kematian ibu menurut WHO Tahun 2015 mencapai 303.000 jiwa. Kejadian plasenta previa secara global berkisar 5,2 per 1000 kehamilan, di Indonesia angka kematian ibu menurut SDKI tahun 2015 mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan kejadian plasenta previa dilaporkan oleh beberapa peneliti berkisar antara 2,4 – 3,5% dari keseluruhan kehamilan.

Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kejadian plasenta previa berdasarkan umur, paritas dan seksio sesarea dengan menggunakan data sekunder dari RSUD Dr H Chasan Boesoeiri Ternate Tahun 2018 – 2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Total Sampling.

Hasil : Dari 65 ibu bersalin yang mengalami plasenta previa di RSUD Dr H Chasan Boesoeiri Ternate 2018 – 2019, didapatkan hasil berdasarkan umur ibu bersalin yang mengalami plasenta previa terbanyak pada umur >35 tahun sebanyak 31 (47%), kemudian berdasarkan paritas ibu bersalin lebih banyak pada paritas <3 yaitu sebanyak 44 (68%) dan pada ibu bersalin yang belum pernah di seksio sesarea yaitu sebanyak 36 (55%).

Kata Kunci : *Plasenta Previa, Gambaran Kejadian*

**OVERVIEW OF THE PLACENTA PREVIA INCIDENCE BY AGE, PARITY
AND HISTORY OF THE CESAREA SECTION AT RSUD DR H CHASAN
BOESIRIE TERNATE, 2018 - 2019**

Sadaruddin Arief

Syamsul Bahri MS Hi Idris, Nurul Hikmah Petran

Department of Medical Education

Khairun University Faculty of Medicine 2020

E - mail :sadaruddinariof@gmail.com

ABSTRACT

Background: Placenta previa is The placenta implants in the lower uterine segment in such a way that it covers all or part of the uterine ostium internum. Placenta previa is a serious complication of pregnancy, which is the leading cause of vaginal bleeding after 20 weeks. The exact cause of placenta previa is unknown. But there are several factors that can be at risk for placenta previa such as maternal age at pregnancy, parity, smoking, history of cesarean delivery, uterine defects and multiple pregnancies. According to WHO, the maternal mortality rate in 2015 reached 303,000. The incidence of placenta previa globally ranges from 5.2 per 1000 pregnancies, in Indonesia the maternal mortality rate according to the 2015 SDKI reached 305 per 100,000 live births, while the incidence of placenta previa reported by some researchers ranges from 2.4 - 3.5% of all pregnancies. .

Methods: This study is a descriptive study of the incidence of placenta previa based on age, parity and cesarean section using secondary data from RSUD Dr H Chasan Boesoeiri Ternate 2018 - 2019. The sampling technique used in this study was total sampling.

Result: Of the 65 mothers who experienced placenta previa at RSUD Dr. H Chasan Boesoire Ternate 2018 - 2019. The results were obtained based on the age of the mothers who had the most placenta previa at > 35 years of age by 31 (47%), then based on parity of mothers giving birth more in parity <3 is 44 (68%) and mothers who have never had cesarean section are 36 (55%).

Keywords: *Placenta Previa, Description of Incidence*