

**GAMBARAN KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI
DI RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRIE
TAHUN 2017-2018**

Marcelina Lia Noveltin, dibawah bimbingan
Muhammad Irwan Sulaiman dan Nurul Hikmah Petrana
Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran Universitas Khairun 2020

ABSTRAK

Ketuban Pecah Dini (KPD) adalah keadaan dimana selaput ketuban pecah sebelum persalinan atau dimulainya tanda inpartu. Menurut World Health Organization (WHO), kejadian ketuban pecah dini berkisar antara 5-10% kasus dari semua kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran KPD berdasarkan usia ibu, pekerjaan, paritas, umur kehamilan, jenis persalinan, dan luaran perinatal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan retrospektif berdasarkan usia ibu, pekerjaan, paritas, umur kehamilan, jenis persalinan, dan luaran perinatal dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari bagian rekam medik RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie tahun 2017-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 137 kasus KPD terdiri dari ibu berusia 20-35 tahun (78,1%), ibu rumah tangga (71,5%), usia kehamilan aterm (78,8%), multipara (50,4%) persalinan sectio sesarea (58,4%), lahir bayi normal (83,2%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketuban pecah dini paling banyak terjadi pada golongan umur 20-35 tahun, usia kehamilan aterm, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, ibu dengan multipara, persalinan paling banyak diakhiri dengan sectio sesarea, dan paling banyak melahirkan bayi lahir normal tanpa asfiksia.

Kata kunci : .Ketuban Pecah Dini, Ternate

**AN OVERVIEW OF THE INCIDENCE OF
PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANE
IN Dr. H. CHASAN BOESOIRIE HOSPITAL
IN 2017-2018**

Marcelina Lia Noveltin, under the guidance
Muhammad Irwan Sulaiman and Nurul Hikmah Petran
Medical Education Study Program
Khairun University Faculty of Medicine 2020

ABSTRACT

Premature rupture of membrane (PROM) is a condition in which the membranes rupture before labor or the start of the signs of labor. According to the Word Health Organization (WHO), the incidence of PROM is between 5-10% of cases of all births. This study aims to determine the description of PROM based on maternal age, occupation, parity, gestational age, type of delivery, and perinatal outcome. This study based on maternal age, parity, occupation, duration of PROM, type of delivery, gestasional age, and perinatal outcomes. This was a descriptive and retrospective study by using secondary data taken from medical records Dr. H. Chasan Boesoirie Hospital in 2017-2018. This result showed a total of 137 cases of PROM. Most patients were 20-35 years (78,1%), housewifery (71,5%), multiparity (50,4%) and primiparity (48,9%), term pregnancy (78,8%), cesarean delivery (58,4%), born a normal baby (83,2%). The conclusion of this research is premature rupture of membranes occurs mostly in the age group of 20-35 years, gestational age at term, work as a housewife, mothers with multiparous, most deliveries end with cesarean section, and most deliver babies born normally without asphyxia.

Keywords: Premature Rupture of Membrane, Ternate