

**KARAKTERISTIK PASIEN OTITIS MEDIA SUPURATIF KRONIK DI
POLIKLINIK TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. H CHASAN BOESOIRIE PERIODE JANUARI – JULI
2019**

Nabila Sidi Umar, Dr. M Isa Pary, Sp. THT Dan Dr. Soesanty, M.M.Kes

Program Studi Pendidikan Dokter

Fakultas Kedokteran Universitas Khairun 2020

ABSTRAK

Latar belakang: Otitis media supuratif kronis (OMSK), adalah infeksi pada telinga tengah dan rongga mastoid, yang ditandai dengan keluarnya sekret dari telinga tengah (otorhoea) dengan perforasi membran timpani. terus menerus, sehingga banyak penderita yang merasa malu secara sosial. OMSK merupakan kelanjutan dari otitis media akut (OMA) dan disertai keluarnya sekret secara persisten dari telinga tengah melalui perforasi membran timpani. Ini menjadi masalah penting untuk mencegah ketulian yang kini menimpa negara berkembang. OMSK dapat dibagi berdasarkan tipe yaitu tipe benigna (tanpa kolesteatoma) dan tipe maligna (dengan kolesteatoma). **Metode Penelitian:** desain penelitian yang digunakan *cross-sectional* dengan menggunakan data pasien yang terdapat dalam rekam medik. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pasien OMSK yang datang berobat di poliklinik telinga hidung tenggorok RSUD Dr. H Chasan Boesoirie periode Januari – Juli 2019. Teknik pengambilan Samping yang digunakan adalah *total sampling*. **Hasil penelitian:** hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasien OMSK berdasarkan usia lebih banyak kelompok usia 11-20 tahun sebanyak 11 orang (33,3%) dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, pasien OMSK berdasarkan jenis kelamin lebih banyak pada laki-laki sebanyak 18 orang (54,5%) dibandingkan perempuan, pasien OMSK berdasarkan keluhan utama lebih banyak pada otorea sebanyak 20 orang (60,6%) dibandingkan gangguan pendengaran dan otalgia, pasien OMSK berdasarkan tipe lebih banyak tipe benigna sebanyak 33 orang (100,0%) dibandingkan tipe maligna, pasien OMSK berdasarkan riwayat otitis media sebanyak 14 orang (42,2%). **Simpulan :** kasus OMSK di RSUD Dr. H Chasan Boesoirie paling banyak terjadi pada laki-laki dengan usia 11-20 tahun, keluhan utama terbanyak pada otorea dengan tipe benigna dan terdapat riwayat otitis media.

Kata kunci : Otitis Media Supuratif Kronik

CHARACTERISTICS AUTHENTIC PASIENTS IN CHRONIC SUPPURATIVE MEDIA IN EAR NOSE THORAT CLINIC OF Dr. H CHASAN BOESOIRIE PUBLIC HOSPITAL JANUARY – JULY 2019

Nabila Sidi Umar, Dr. M. Isa Pary, Sp.THT, Dr. Soesanty, M.M.Kes

Medical Education Study Program

Medical Faculty University Of Khairun 2020

ABSTRACT

Background: Chronic suppurative otitis media (CSOM), is an infection of the middle ear and mastoid cavity, which is characterized by secretions from the middle ear (otorrhoea) with tympanic membrane perforation. there are many sufferers who feel socially ashamed. CSOM is a continuation of acute otitis media (AOM) and is accompanied by a persistent discharge from the middle ear through the perforation of the tympanic membrane. This is an important problem to prevent deafness that is now affecting developing countries. CSOM can be divided by type, namely benign type (without cholesteatoma) and malignant type (with cholesteatoma). **Research Method:** The study design used was cross-sectional using patient data contained in medical records. The sample in this study were all CSOM patients who came for treatment at the ear nose throat clinic of Dr. H Chasan Boesoirie for the period January - July 2019. The sampling technique used was total sampling. **The results of the study:** the results of this study indicate that CSOM patients based on 11-20 years age group as many as 11 people (33.3%) compared to other age groups, CSOM patients by sex are more numerous in males by 18 people (54.5%) compared to women, CSOM patients based on the main complaint was more in otorrhoea with 20 people (60.6%) compared to hearing loss and otalgia, CSOM patients by type had more benign types as total 33 people (100, 0%) compared to malignant type, CSOM patients based on a medical history of otitis media were 14 people (42.2%). **Conclusion:** CSOM case in RSUD Dr. H Chasan Boesoirie is most common in men aged 11-20 years, the most common complaint is otoreea with benign type and there is a history of otitis media.

Keywords: Chronic Suppurative Otitis Media